

Patientjournal

Patientens namn

Födelsedatum

Telefon (hem)

E-mail

Telefon (arbete)

Adress

Tidigare behandlingar

Behandlad av

Besök I

Behandlingsdatum

Datum för touch-up/återbesök

Område-specifitera

Produkt

Åtgång ml

Sprutetikett:



Foto

Lämnat ut "Checklista efter behandling"

Ja Nej

Datum

Ja Nej

Bedövning:

Anteckningar besök I:

Besök 2



Behandlingsdatum

Datum för touch-up/återbesök

Område-specifcera

Produkt

Åtgång ml

Sprutetikett:

Område-specifcera	Produkt	Åtgång ml	Sprutetikett:

Foto

Lämnat ut "Checklista efter behandling"

Ja Nej

Datum

Ja Nej

Bedövning:

Anteckningar besök 2:

Besök 3



Behandlingsdatum

Datum för touch-up/återbesök

Område-specifcera

Produkt

Åtgång ml

Sprutetikett:

Område-specifcera	Produkt	Åtgång ml	Sprutetikett:

Foto

Lämnat ut "Checklista efter behandling"

Ja Nej

Datum

Ja Nej

Bedövning:

Anteckningar besök 3:

Patientsamtycke till behandling med Restylane produkter

Restylane® produkterna* är sterila, geléaktiga ämnen som består av icke-animalsk, stabiliserad hyaluronsyra. Restylane Lidocaine produkterna innehåller dessutom 0.3% lidocain (ett bedövningsmedel). Produkterna injiceras i huden för att jämna ut fåror och rynkor och för att omforma läppar samt utforma ansiktskonturer. De används också för att återställa elasticiteten i hya samt minska ojämnheter på huden.

Den praktiker som behandlar mig, har förklarat hur och när Restylane produkterna används. Jag har haft förmånen att kunna ställa frågor och erhållit tillfredsställande svar på dem. Jag har fått särskild information vad beträffar tillfällena när behandling med Restylane produkter inte bör ske samt information om att vissa reaktioner är vanliga i samband med injektionerna. De här reaktionerna består av rodnad, svullnad, smärta, klåda, blåmärken och ömhet vid implantationsstället. Dessa reaktioner är vanligen milda till måttliga och försvinner vanligen inom kort efter injektionen. De går vanligen över spontant ett par dagar efter injektion i huden, inom en vecka efter injektion i läpparna och inom två veckor efter injektion med Restylane SubQ.

Jag har också erhållit information om de risker som finns när man genomför injektioner i områden med en underliggande känslig anatomi (t.ex. nerver, kärl

och ögon när man behandlar rynkor i det området).

Tillfälliga biverkningar relaterade till injektionerna kan uppstå; vissa av dessa består av svullnad, rodnad och ömhet. Det finns enstaka rapporter om små knölar som uppkommit på behandlingsstället och om ojämnheter som kan kvarstå i flera månader om hudinjektionen lagts för ytligt.

I sällsynta fall har inflammatoriska reaktioner rapporterats; de har bestått av rodnad, svullnad och skleros vid injektionsstället, något som ibland kan påverka omgivande vävnad. Reaktionerna har uppstått inom några dagar eller veckor efter behandlingen. De har vanligen varit lätta till måttliga och begränsade, och den genomsnittliga tiden är två veckor. I sällsynta fall har reaktionerna varit återkommande och kvarstått i flera månader.

I mycket sällsynta fall, så har det uppstått en förlängd sklerosbildning, varbildning samt en gråaktig missfärgning vid behandlingsstället. De här reaktionerna kan utvecklas efter veckor eller månader efter en behandling och kan kvarstå i flera månader. I sällsynta fall har en längre varaktighet rapporterats, men de här reaktionerna avtar vanligen med tiden. Bildning av en sårskorpa och ömsande av skinn vid behandlingsstället är ännu mer sällsynt och kan i mycket sällsynta fall resultera i ytlig ärrbildning.

Jag har informerats om att Restylane Lidocaine produkterna innehåller lidocain och att de inte får användas på personer med en känd överkänslighet för lidocain eller lokalanestetika av amidtyp. På liknande sätt som då man ger lokalbedövning inom tandvården, så är man under cirka två timmar mindre känslig för smärta, värme och kyla i det behandlade området.

Den praktiker som behandlar mig har också informerat mig om att, beroende på vilket område som behandlas och beroende på injektionstekniken, så kan effekten av behandling med Restylane kvarstå i 6-12 månader (i läpparna ca 6 månader), men den här perioden kan variera och behandlingen kan sitta i antingen längre eller kortare tid. Med hjälp av uppföljningsbehandling upprätthåller man den önskade justeringen.

Jag har svarat ärligt på frågor gällande eventuell överkänslighet mot bedövningsmedel och frågor gällande min medicinska bakgrund. Jag har också fått en "Kontrollista för efterbehandling" samt information om dess innehåll. Jag är medveten om vikten av att följa råden i kontrollistan.

Jag samtycker härmed till behandling med Restylane produkter.

Datum

Patientens namn (med tryckbokstäver)

Patientens underskrift

Restylane®